

# Август

## Прохождение Луны через знаки зодиака в августе

Овен	♈	20 (22.20), 21, 22, 23
Телец	♉	23 (00.20), 23, 24, 25
Близнецы	♊	25 (02.41), 26, 27
Рак	♋	1, 2*, 27 (06.07), 28, 29
Лев	♌	2* (04.13), 3*, 4*, 29 (11.13), 30, 31
Дева	♍	4 (10.35), 5, 6, 31 (18.23)
Весы	♎	6 (19.58), 7, 8, 9
Скорпион	♏	9 (07.53), 10, 11
Стрелец	♐	11 (20.25), 12, 13, 14
Козерог	♑	14 (07.13), 15, 16
Водолей	♒	16* (14.53), 17*, 18*
Рыбы	♓	18* (19.35), 19, 20

## Фазы Луны в августе

Характер Луны	Убы- вает	Растет			Убывает
Дата и время начала периода	2 (23.46) ●	10 (21.22) ☾	18 (12.28) ○	25 (06.42) ☾	
Фаза Луны	IV	I	II	III	IV

**Рекомендации:** посадка, полив, подкормка в фазах I и III, посев, прополка и опрыскивание в фазах II и IV.

## Что надо делать в августе?

1. В такую погоду, когда температура почвы снижается до 12°С, корневая система теплолюбивых растений не работает, и, чтобы сохранить точку роста, растения начинают забирать питательные вещества из листьев, поэтому листва преждевременно желтеет и опадает. Чтобы поддержать растения, необходимо делать внекорневые подкормки. Лучше всего для этих целей подходит удобрение **Унифлор-бутон**. Достаточно 2 ч. ложек на 10 л воды. Опрыскивание надо делать под вечер или в пасмурную погоду. Надо так выбрать время, чтобы по крайней мере 3 часа после опрыскивания не было дождя.

2. Как и в июле, основной враг тепличных томатов — фитофтора и плодовая гниль.

3. На огурцах появляется антракноз. Листья выглядят практически так же, как и при бактериозе, но на молоденьких зеленцах появляются капельки розовой росы, под которыми гниль. Опрыскивать раствором **Фитоспорина** (3 ст. ложки на 10 л) или **Циркона** (6–8 капель на один литр воды). Применять химические средства, в том числе препараты, содержащие медь, нельзя.

4. От луковиц следует отгрести почву так, чтобы луковица стояла на почве на корнях. Надо полить раствором поваренной соли (1 стакан соли на ведро воды) и оставить луковицу неприкрытой.

5. Подобным образом следует поступить с капустой: сначала отгрести почву и полить раствором соли сверху «по голове», а затем, в отличие от лука, вновь окучить.

Не забывайте регулярно, примерно 1 раз в 15–20 дней поливать капусту для защиты от килы раствором кальциевой селитры (3 ст. ложки на 10 л воды, по 1/2 л под куст) или известковым молочком (стакан извести или доломита, можно мела, на 10 л воды по 1/2 л под куст).

6. Против вредителей овощей сейчас можно использовать только **Фитоверм** или **Здоровый сад** (4–6 крупинок на 1 л воды).

7. Я сажаю озимый чеснок не в октябре, а в конце августа, примерно 25–26-го (для Северо-Западного региона).

Попробуйте сделать ранние посадки чеснока в этом году. Сделайте отверстия для долек чеснока глубиной примерно 12–15 см, насыпьте в каждое 1 ст. ложку песка, опустите гранулу удобрения **AVA** и дольку чеснока, сверху засыпьте ложкой песка и зарыхлите почвой. При такой глубокой посадке чеснок осенью не взойдет, но зато у него разовьется мощная корневая система, с которой он будет зимовать. Удобрение прослужит все лето, и никаких подкормок не потребуются, а песок создаст вокруг головки чеснока микродренаж, и она не будет гнить.

**8.** В начале месяца, как только вы уберете урожай смородины и крыжовника, следует сразу подкормить и обработать ягодные кустарники. При уборке урожая снимайте паутинные гнезда, подсохшие ягоды, закрученные листья и сжигайте их. Ягодники начинают закладывать урожай будущего года, у них начинается рост корневой системы, поэтому им требуется минеральная подкормка суперфосфатом и калием.

Для красной смородины и крыжовника достаточно взять по 1 ст. ложке двойного суперфосфата и по 2 ст. ложки не содержащего хлор калия на куст, а для черной смородины — 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложку калия. Удобрения лучше вносить при поливе в сухую погоду и заделывать в верхний слой почвы в дождливую. Использовать хлористый калий нежелательно, особенно для крыжовника, поскольку он сразу сбросит листья, а для успешного развития корней листья тоже нужны. Крыжовник может сбросить листья преждевременно и при длительной засухе, если вы его не польете.

**9.** Не следует давать ягодникам в августе азотную подкормку, тем более использовать настой сорняков или навоза, поскольку азот вызывает рост концов у веток. Этот новый прирост не успеет одревеснеть и зимой засохнет. Наоборот, следует остановить рост веток, для этого следует прищипнуть (оборвать) верхушки веток у черной смородины и крыжовника, но не у красной смородины, поскольку именно на концах веток красной смородины закладывается наибольшее количество плодовых почек. Никогда не обрезайте концы веток красной смородины! У черной смо-

родины, наоборот, можно ежегодно укорачивать ветки на 5–6 см.

**10.** Сорняки под кустами следует срезать плоскорезом или полольником, заглубляя его в почву примерно на 2 см, и оставлять их прямо под кустами.

**11.** Начало августа — это крайний срок для обработки посадок земляники. Долгоносик возвращается на зимовку под кустики земляники. Как только на молодых листочках появятся проколы или мелкие дырочки, надо опрыскать землянику **Фитовермом**. У земляники к концу августа должна быть большая зеленая масса, поскольку у нас очень часто бывают ранние и довольно сильные заморозки в конце августа или начале сентября, а у земляники самое слабое место — это корневище. Необходимо, чтобы земляника прикрывала его собственными листьями. Если вы не успели обработать кустики до середины августа, оставьте их зимовать так, как есть. Это лучше, чем оставлять оголенные, не прикрытые листьями корневища.

**12.** У земляники корневище нарастает (выпирает) наверх, и в верхней его части отрастают молодые корешки, которые нуждаются в почве, поэтому кустики следует в конце лета приокучить почвой или подсыпать под них новую почву, но так, чтобы не засыпать «сердечко». Плодоношение земляники уменьшается с годами именно по этой причине: молодые корешки повисают над землей и просто высыхают или вымерзают, на оставшейся под почвой части старого корневища недостаточно молодых корешков для обильного плодоношения.

**13.** Если вы вносили при посадке земляники удобрение АВА, в течение 3 лет подкармливать землянику не надо. Если вы этого не делали, то следует под каждый кустик сделать в почву  $\frac{1}{2}$  ст. ложки азофоски. Входящий в ее состав азот нужен землянике в конце сезона, чтобы нарастить молодые листья, зимующие под снегом.

**14.** В конце месяца на старых, краснеющих листьях земляники могут появиться белые точки — пикниды гриба, вызывающего заболевание — белую пятнистость листьев земляники. Ничего страшного нет, даже если земля-

ника перезимует с этими листьями, если вы хорошенько прольете кусты раствором **Фитоспорина** или опрыскаете **Цирконом**. Любое из средств избавит листья от заразы.

### К СВЕДЕНИЮ ЛЕНТЯЕВ

Не убирайте старые листья — они прикроют корневище и уберегут кустик от вымерзания при морозах без снега. Кроме того, если вы в самом начале мая польете эти старые листья **Фитоспорином** или опрыскаете **Цирконом**, то окончательно уничтожите на них заразу.

Не следует убирать старые листья. Во-первых, они перекроют доступ спорам гриба серой гнили к ягодам (поскольку лежат на почве, а гриб живет в ней). Во-вторых, обеспечат питанием молодые корешки. В-третьих, прикроют верхний слой почвы (замульчируют) и тем самым не дадут влаге испаряться из почвы, а потому вам не придется поливать землянику летом. Можно не убирать и цветоносы. Так что, если хотите упростить себе работу, обеззараживайте листья, а не обрезайте их.

**15.** Если весной на крыжовнике мучнистая роса (серый войлочный налет на листьях и ягодах) сгубила урожай или подпортила его, придется сделать опрыскивание препаратом **Циркон** в начале августа, затем еще раз в конце августа или самом начале сентября (если к тому времени на нем еще останутся листья). Следует выполоть сорняки и обработать почву под кустом **Фитоспорином**. Следующей весной обязательно проведите трехкратную обработку: по молодым листьям, затем через 2 недели по молодым завязям и после уборки урожая, чтобы искоренить возбудителя гриба на 4–5 лет.

**16.** Это же относится с яблоням, пораженным паршой (черные пятна появляются сначала на листьях, потом на яблоках). Надо провести такую же, как для крыжовника, трехкратную обработку **Цирконом**.

**17.** У вишен, слив, облепихи и сирени в августе убирают всю корневую поросль. Если вы хотите взять у них корневые отпрыски, это надо сделать в первой половине августа, причем не следует брать их близко от материнского ствола. Лучше всего взять их в 1,5–2 м от него, иначе вы сильно повредите корни у материнского растения.

**18.** Если у вишен или слив происходит преждевременное пожелтение и сброс листьев уже в августе, то причина — либо в монилиозе, либо в коккомикозе. Трехкратное опрыскивание профилактическим коктейлем или хотя бы одним **Цирконом** в течение сезона поможет на некоторое время остановить гибель дерева, однако полностью избавиться растение от этих болезней не удастся. Рано или поздно с ними придется распрощаться, поскольку плодоносить они будут все хуже и хуже. Поросль от такого растения брать не следует.

**19.** В цветниках большой урон лилиям (восточным гибридам) может нанести красный жук — лилиевая журчалка. Обработайте растения препаратом против колорадского жука (**Актара**).

**20.** Весь август можно еще высаживать малину и землянику.

**21.** Картофель ранних и среднеранних сортов нужно убрать в двадцатых числах августа, в противном случае он сгниет в земле.