

# Симптомы

# 1



## Боль в животе

 **П**ричинами боли в животе могут быть различные заболевания:

- ✎ желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь, энтерит);
- ✎ печени и желчного пузыря (гепатит, холецистит, желчнокаменная болезнь);

- ☛ почек (мочекаменная болезнь);
- ☛ половых органов (внематочная беременность, аднексит);
- ☛ позвоночника (остеохондроз);
- ☛ нервной системы (радикулит);
- ☛ мышц брюшной стенки (миозит);
- ☛ и даже органов грудной клетки (плеврит).

Боль различается по месту расположения:

- ☛ в правом верхнем отделе живота (холецистит, желчнокаменная болезнь, гепатит);
- ☛ левом верхнем отделе живота (гастрит, язвенная болезнь, грыжа пищеводного отдела диафрагмы);
- ☛ средней части живота (эзофагит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы);
- ☛ правой нижней части живота (аппендицит, аднексит);
- ☛ нижней левой части живота (сигмоидит, аднексит).

Кроме того, боль различается: по характеру (жжение свидетельствует о раздражении, давление говорит о перерастяжении, спазм — о сильных сокращениях); времени появления (связь с приемом пищи, периодичность); частоте (однократная, редкая, частая).

Сравнительная характеристика заболеваний, при которых боль в животе является одним из ведущих симптомов, представлена в табл. 1.1.

**Обследование.** Общий анализ мочи и крови, биохимический анализ крови, исследование кала, рентгенологическое и ультразвуковое исследование органов брюшной полости, осмотр доступных отделов кишечника оптическим гибким зондом.

**Ни в коем случае нельзя применять обезболивающие препараты до окончательного выявления причины боли в животе! Это может скрыть картину серьезной «аварии» в брюшной полости и тем самым отдалить оказание немедленной медицинской помощи, что в обязательном порядке приведет к тяжелым осложнениям, иногда — фатальным.**

Таблица 1.1. Боль в животе

	Язвенная болезнь	Хронический гастрит	Рак желудка или кишечника	Острый аппендицит	Кишечная непроходимость
<b>Когда возникает боль</b>	Вскоре после приема пищи, через 1–3 ч после приема пищи, ночью	После приема пищи	На поздних стадиях заболевания, постоянная	Внезапно	Через некоторое время после задержки стула
<b>Характер боли</b>	Острая, мучительная, интенсивная, может быть тупой, давящей, режущей	Умеренная, ноющая, ощущение тяжести, распирания	Продолжительная, вначале непостоянная, затем очень интенсивная	Умеренной интенсивности, постоянная	Чрезвычайно интенсивная, схваткообразная, нестерпимая
<b>Локализация боли</b>	В верхней половине живота	В верхней половине живота	Разлитая, без четкой локализации	Внизу живота справа	По всему животу без четкой локализации
<b>Распространение боли</b>	Не характерно	Не характерно	Зависит от распространения (метастазирования) опухоли	Может быть на весь живот, в области пупка	Не характерно
<b>Рвота</b>	Кислая, приносит временное облегчение	Да	Да, может быть вида кофейной гущи	Однократная	Вначале съеденной пищей, затем желчью, далее — содержимым кишечника с каловым запахом

Продолжение на следующей странице



Таблица 1.1 (продолжение)

	Язвенная болезнь	Хронический гастрит	Рак желудка или кишечника	Острый аппендицит	Клиническая непроходимость
<b>Стул</b>	Склонность к запорам	Чередование поносов и запоров	Запоры, может быть задержка стула вследствие непроходимости кишечника, стул может быть с кровью или черного цвета	Запор	Запор
<b>Когда исчезает боль</b>	После приема соды, воды	Через 3–5 дней	Практически не исчезает, плохо обезболивается	Через один или несколько суток	После восстановления проходимости
<b>Сопутствующие состояния</b>	Сезонность боли (весна, осень, зима), изжога, слабость	Отрыжка, тошнота, срыгивание, уменьшение аппетита, похудание	Неприятный вкус во рту, истощение, отрыжка, икота, потеря аппетита, отращивание к мясу, выраженная слабость	Понижение аппетита, учащенное сердцебиение, повышение температуры тела	Задержка газов, вздутие живота, урчание в животе
<b>Чем провоцируется</b>	Грубой, кислой, соленой, острой пищей	Грубой, кислой, соленой, острой пищей	Нет четкой связи	Нет четкой связи	Опухолями, сужениями (стенозами), заворотами кишечника

	Пищевые токсикоинфекции	Желчная колика	Острый панкреатит	Внематочная беременность	Разрыв (апоплексия) яичника
<b>Когда возникает боль</b>	Через 0,5–4 ч после приема инфицированной пищи	Через 3–4 ч после еды, ночью	Внезапно	Внезапно	В середине менструального цикла
<b>Характер боли</b>	Интенсивная, схваткообразная	Сильная, невыносимая, жгучая	Опоясывающая, сильная, мучительная, нестерпимая	Острая	Схваткообразная
<b>Локализация боли</b>	По всему животу без четкой локализации	В области правого подреберья	В верхней половине живота	Внизу живота	Внизу живота
<b>Распространение боли</b>	Не характерно	В правое плечо, руку	В спину	В промежность	В промежность, пах, крестец, ногу на стороне поражения
<b>Рвота</b>	Многократная	Многократная, желчью	Мучительная, многократная	Иногда	Не характерна
<b>Стул</b>	Понос жидкий, водянистый, с примесью слизи	Запор или понос	Запор	Без особенностей	Без особенностей
<b>Когда исчезает боль</b>	Через несколько дней	Через один или несколько суток	Через несколько часов или суток	Самостоятельно не исчезает, необходимо экстренное лечение	Самостоятельно не исчезает, необходимо экстренное лечение
<b>Сопутствующие состояния</b>	Тошнота, слабость, головокружение	Тошнота, вздутие живота	Тошнота, вздутие живота, кожные высыпания на лице и боковых поверхностях живота	Обморок, головокружение, шум в ушах, бледность, учащенное сердцебиение, падение артериального давления, холодный пот	Обморок, головокружение, шум в ушах, бледность, учащенное сердцебиение, падение артериального давления, холодный пот у девушек и женщин 17–30 лет
<b>Чем провоцируется</b>	Инфицированными или несвежими продуктами питания	Обильной жирной, жареной, острой, копченой пищей, алкоголем	Обильной жирной, жареной, острой, копченой пищей, алкоголем	Нет четкой связи	Нет четкой связи