

Цветение мать-и-мачехи — начало огородных работ

1. Посеять в грунт все холодостойкие культуры (морковь, петрушку, укроп, черешковый и листовой сельдерей, салат, лук-чернушку, щавель, редис).
2. Подготовить клубни картофеля для посадки.
3. Опрыскать **Экоберином** (или **Эпином-экстра**) хвойные культуры и вечнозеленые рододендроны против солнечных ожогов. Повторять опрыскивание еженедельно, если хвоя или листья стали желтеть или темнеть.
4. Это же лучшее время для посадок и пересадки хвойных растений.
5. За неделю до распускания почек на черной смородине следует обобрать на ней все вздутые крупные круглые почки (они хорошо видны на голых ветках). В них находятся личинки почкового клеща. Опоздаете — почки раскроются, и бродяжки расползутся по молодым почкам. На следующий год придется всю ветку удалять.

Мероприятие	2017	2018	2019	2020
Посев холодостойких культур				
Подготовка клубней картофеля к посадке				
Опрыскивание растений против солнечных ожогов				
Посадка и пересадка хвойных растений				
Сбор крупных почек на черной смородине (за неделю до их распускания)				

Распускание почек на смородине, красной рябине, березе — начало работ в саду

1. Опрыскать эти растения защитным коктейлем (или хотя бы **Фитовермом**) против тли, которую разносят муравьи.
2. Накапать гель против муравьев и тараканов на стволы рябины, яблонь, вишен, слив, стебли черной смородины, пионов и роз поближе к почве.
3. Кроме того, сейчас идет весенний лет пилильщиков на яблоню, грушу, сливу, смородину, крыжовник, а следовательно, их тоже следует опрыскать. На некоторых сортах крыжовника может появиться белый налет на молодых листьях. Это американская мучнистая роса (сферотека). Если срочно не принять меры (не опрыскать защитным коктейлем или хотя бы **Цирконом**: 6 капель на литр воды), то роса перейдет на молодые завязи и, в конце концов, ягоды покроются серым плотным войлочным налетом. Опрыскивание следует повторить по молодым завязям и после сбора урожая ягод.
4. Обливание кипятком от сферотеки не спасает. Это просто устоявшееся заблуждение (но, как говорят, никакие факты не смогут опровергнуть устоявшиеся заблуждения). А потому, если охота вам мыть кусты кипятком по весне — мойте, вреда от этого нет, хотя и большой пользы тоже.
5. Концы веток красной смородины надо обязательно тщательно опрыскать **Фитовермом**, поскольку там находятся яйца красногалловой тли, вызывающей малиновые вздутия на листьях красной смородины.
6. Надо также опрыскать всходы зонтичных культур (моркови, петрушки, укропа) **Фитовермом** против зонтичной листоблошки, вызывающей закручивание их листьев. Зонтичная листоблошка зимует в трещинах коры хвойных пород. Особенно удобна для зимовки

всех вредителей, а не только листоблошки, кора сосны. Вот и не сажайте сосну на участке.

7. Если посеы холодостойких культур сразу накрыть лутрасилом, то опрыскивание всходов против листоблошки не потребуется.
8. Сделать профилактическое опрыскивание защитным коктейлем (или хотя бы **Фитовермом**) посадок земляники против долгоносика.
9. Можно посеять на рассаду в тепличку капусту средних и поздних сроков созревания, цветную капусту и брокколи, свеклу, однолетние цветы (бархатцы, ноготки, агератум, настурцию, ипомею, мальву, сальвию, гипсофилу, циннию, флокс друммонда и другие).
10. В это же время можно сеять в грунт семена холодостойких цветов: васильков, колокольчиков, космеи, маков, в том числе эшшольции, ромашек, петунии, немезии, маттиолы, однолетних астр.

Мероприятие	2017	2018	2019	2020
Опрыскивание растений против тли				
Нанесение геля против муравьев и тараканов				
Опрыскивание растений против пилильщиков				
Борьба со сферотекой (если есть)				
Опрыскивание зонтичных культур против листоблошки				
Опрыскивание земляники против долгоносика				
Посев в теплицу некоторых овощей и цветов				
Посев в грунт холодостойких цветов				

Начало цветения черемухи

1. Во время цветения черемухи (или сразу после окончания) можно высаживать картофель.
2. Кроме того, в грунт высаживают рассаду кочанной капусты, высевают горох, бобы, лук-севок. Под пленочное или двойное укрытие нетканым материалом типа лутрасила или спанбонда, акриси на утепленный грунт (или компост) можно высевать семена кабачков и патиссонов, огурцов, тыквы (или высаживать трехнедельную рассаду тыквенных культур).
3. Это время подходит для посадки деревьев, в том числе и хвойных.
4. Через неделю после начала цветения черемухи (перед самым цветением крыжовника) сделать опрыскивание вишни, сливы, груши, яблони ранних сортов, крыжовника, красной и черной смородины защитным коктейлем, добавив в него препарат **Завязь** (или **Бутон**) на случай повреждения бутонов и цветков заморозками.
5. Примерно через неделю после цветения смородины на листьях могут появиться либо мелкие желтые точки, либо крупные бородавки оранжевого цвета. Мелкие точки вызывают споры гриба столбчатой ржавчины, который зимует на хвойных породах, а крупные — бокальчатая ржавчина, переходящая с осоки. Осоку в ближайшей округе неплохо бы заранее скосить. При первых признаках поражения кусты следует опрыскать **Цирконом** (поскольку приходится бороться с заболеванием, профилактическими мерами уже не обойтись, надо делать раствор более высокой концентрации: 6–10 капель на один литр воды). Желательно опрыскивать растения с нижней стороны листьев. Для этого удобно использовать угловую насадку к опрыскивателю **Туман**. Или применяйте бордоскую жидкость.
6. Сразу после цветения черемухи пересадить рассаду томатов, перца, баклажанов в теплицу под двойное укрытие неткаными материалами.

7. Посейте в открытый грунт зернобобовые культуры.
8. За 10 дней до цветения крыжовника следует опрыскивать кусты крыжовника, красной и черной смородины против крыжовниковой огневки, бабочка которой откладывает яйца в цветки. По мере роста завязи отродившиеся гусеницы питаются их мякотью, переполая из одной в другую, и каждая может уничтожить до 8–10 ягод. Заранее отметьте для себя дату появления вредителя, отсчитав назад 10 дней от даты в следующей строке.

Мероприятие	2017	2018	2019	2020
Посадка картофеля				
Посев некоторых овощей в грунт				
Посадка деревьев				
Опрыскивание против заморозков				
Борьба со столбчатой или бокальчатой ржавчиной (если есть)				
Пересадка некоторых овощей в теплицу				
Посев зернобобовых в открытый грунт				
Опрыскивание крыжовника и смородины против крыжовниковой огневки				

Цветение крыжовника и красной смородины

1. Во время цветения крыжовника и смородины все еще можно пересаживать в теплицу рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов, накрыв их дополнительно двойным нетканым материалом в регионах, где бывают возвратные ночные заморозки.
2. Пересадить рассаду капусты: брокколи и цветной, а также брюссельской в открытый грунт (там, где могут быть сильные заморозки, надо прикрыть посадки оди-
нарным лутрасилом), посеять капусту кольраби в от-
крытый грунт.
3. Сразу после высадки рассады следует опрыскать ее за-
щитным коктейлем.
4. На молодые растения капустных (крестоцветных) куль-
тур может напасть крестоцветная блошка (мелкий жу-
чок с металлическим отблеском, зимующий в почве).
Для борьбы с ней можно использовать раствор любого
шампуня для мытья кошек и собак против блох: 3 ст.
ложки на 10 л воды. Укрытие растений лутрасилом от
блошки не спасает, поскольку она выходит из почвы,
а не прилетает невесть откуда.
5. В это же время можно сажать лук в открытый грунт.

Мероприятие	2017	2018	2019	2020
Пересадка рассады некоторых овощей в теплицу				
Посадка рассады ка- пусты в открытый грунт				
Опрыскивание капу- сты защитным кок- тейлем				

